SIMPOSIO VIRTUAL

AVANCES EN UROLOGIA 2020

11 Y 12 DE SEPTIEMBRE DE 2020

BUENOS AIRES, ARGENTINA

SAU

SOCIEDAD ARGENTINA DE UROLOGIA

Fundada en 1923

El primer y único tratamiento aprobado para CPRC metastásico y no metastásico.[1]

¿METÁSTASIS? ¿NO METÁSTASIS? COMIENCE CON XTANDI

Independientemente del estado metastásico, XTANDI ofrece a los pacientes con CPRC la confianza de un medicamento con eficacia comprobada cuando el PSA aumenta* durante el tratamiento con LHRH†[1]

*Valor de PSA ≥ 2 ng/ml con al menos dos incrementos consecutivos a pesar de tener niveles de testosterona de castración (≤ 50 ng/dl).[2]

Se define al cáncer de próstata resistente a la castración como la evolución de una enfermedad bajo un tratamiento de deprivación androgénica (tratamiento con LHRH o previa orquiectomía bilateral).[3]LHRH, hormona liberadora de la hormona luteinizante; PSA: Antígeno prostático específico (por sus siglas en inglés).

†O después de una orquiectomía bilateral.[1]

Xtandi®
(enzalutamida)
40 mg cápsulas

Indicación

XTANDI (enzalutamida) se indica para el tratamiento de pacientes con cáncer de próstata resistente a la castración (CPRC).

1. XTANDI (prospecto). Laboratorios RAFFO. 2. Astellas. XTANDI. data on file. 3. Eisenberger MA, Saad F. Introduction—Castrate resistant prostate cancer: a rapidly expanding clinical state and a model for new therapeutic opportunities. In: Saad F, Eisenberger MA, eds. Management of Castration Resistant Prostate Cancer. 1era ed. New York, NY: Springer, 2014:3-8.

astellas ONCOLOGÍA

© 2018 Astellas Pharma US, Inc. Todos los derechos reservados. Impreso en EE. UU. 076-3483-PM 6/18
XTANDI, Astellas y el logotipo de la estrella voladora son marcas registradas de Astellas Pharma Inc.

RAFFO

Información Disponible Para Profesionales: Departamento Médico Raffo: Tel (011)4509-7100
Complejo Urbana 1 - Int. Cnel. Amaro Ávalos 2829 - 3º Piso (B1605 EBQ) Munro/Vte. López/Pcia. de Bs. As.

WWW.RAFFO.COM.AR

Acetato de Leuprolide
22,5 – 45 mg

Eligard®

45

ELIGARD® 45 mg
ACOMPAÑÁNDOTE EN EL CAMINO

(Deprivación androgénica con solo 2 aplicaciones anuales)

INDICACIÓN
ELIGARD® está indicado para el tratamiento paliativo del cáncer de próstata avanzado.

PRESENTACIÓN
ELIGARD® está disponible en un kit para uso único que consiste en un sistema de mezclado de dos jeringas con una aguja estéril en las siguientes concentraciones:

- ELIGARD® 45 mg
- ELIGARD® 22,5 mg

RAFFO

Información Disponible Para Profesionales: Departamento Médico Raffo: Tel (011)4509-7100
Complejo Urbana 1 - Int. Cnel. Amaro Ávalos 2829 - 3º Piso (B1605 EBQ) Munro/Vte. López/Pcia. de Bs. As.

WWW.RAFFO.COM.AR

COMITÉ ORGANIZADOR

Directores

Dr. M. Costa
Dr. N. Lafos
Dr. C. Scorticati

Secretarios Científicos

Dr. C. Koren
Dr. W. Villamil

Secretarios Administrativos

Dr. H. Malagrino
Dr. J. Ramos Suppicich

Coordinadores

Dr. D. Barreiro
Dr. J. Belinky
Dr. L. Capiel
Dr. A. Momesso
Dr. G. Moncalvo
Dr. C. Palazzo
Dr. G. Perazzo
Dr. N. Rosenfeld

DISERTANTES

Dr. D. Barreiro
Dr. J. Belinky
Dr. N. Bernardo
Dr. L. Capiel
Dr. A. Casabè
Dr. P. Contreras
Dr. M. González
Dra. L. Jufe
Dr. C. Koren
Dr. M. López
Dr. A. Momesso
Dr. G. Moncalvo
Dr. C. Palazzo
Dr. G. Perazzo
Dr. N. Rosenfeld
Dr. J. Rozanec
Dr. C. Scorticati
Dr. W.Villamil

Prolaris®
Prostate Cancer

myriad®

VARIFARMA
Compromiso con la calidad
LATINOAMÉRICA

NUEVA HERRAMIENTA EN EL TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE PRÓSTATA

Prolaris®
Prostate Cancer

TEST GENÓMICO PARA CÁNCER DE PRÓSTATA

Mide el grado de agresividad del tumor y predice el riesgo de progresión de la enfermedad a 10 años

Estima del riesgo de recurrencia de la enfermedad (BCR) en pacientes luego de la prostatectomía

Ayuda a identificar a los pacientes candidatos para vigilancia activa en el diagnóstico

Es pronóstico en la etapa del diagnóstico y luego de la cirugía

myriad®

VARIFARMA
Compromiso con la calidad

ARGENTINA • BRASIL • CHILE • COLOMBIA
ECUADOR • PARAGUAY • PERÚ • URUGUAY

Para el tratamiento de los síntomas de tracto urinario inferior asociados a **Hiperplasia Prostática Benigna (HPB).**

DESCUENTO PAMI 50%

Reduprost® DÚO

Tamsulosina / Dutasteride

Presentación

Envases conteniendo

30 cápsulas rígidas de liberación controlada
de Dutasterida 0,5 mg.
+ Tamsulosina Clorhidrato 0,4 mg.

Reduprost®

Tamsulosina 0.4 mg

Presentación

Envases conteniendo

30 y 60 cápsulas de liberación controlada
de Tamsulosina 0,4 mg.

Sentite seguro vayas donde vayas.

RAFFO

El tratamiento más avanzado
a nivel mundial en Argentina.

Advanced®
Radiotherapy

Un nuevo concepto
PARA EL TRATAMIENTO ONCOLÓGICO.

Advanced Radiotherapy es un servicio de oncología radiante que conjuga tecnología de punta, excelencia profesional, investigación científica y servicio personalizado, con el objeto de mejorar notablemente la calidad de vida de quienes transitan un tratamiento oncológico.

Nuestro servicio. Tu tranquilidad. | Enfocados en cada persona.

- **Metodología de referencia internacional.**
- **Calidad humana y profesionalismo durante todo el tratamiento.**
- **Amplia gama de técnicas con equipos específicos para diseñar un tratamiento personalizado.**
- **Enfocado en el confort y bienestar del paciente.**

Advanced®
Radiotherapy

Vidt 1924 (C1425DTK), Buenos Aires - Argentina
Tel. Advanced Radiotherapy (5411) 5278-6001
info@advancedradiotherapy.com
www.advancedradiotherapy.com

PROGRAMA CIENTIFICO

VIERNES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020

14:45 – 15:00 **APERTURA DEL SIMPOSIO SAU**
Moderadores: *Dr. Norberto Lafos*
Dr. Miguel A. Costa

15:00 – 15:30 **CONFERENCIA**
Nefrolitotricia Minipercutanea, Super-minipercutanea. ¿Cuánto más pequeño mejor?
Disertante: *Dr. Nicolás Rosenfeld*
Moderadores: *Dr. Adrián Momesso*
Dr. Carlos Scorticatii

15:30 – 16:00 **CONFERENCIA**
Rol de la cirugía en la recaída ganglionar posterior al tratamiento del primario (prostatectomía radical o radioterapia) y en el CPRC M0
Disertante: *Dr. Carlos Scorticati*
Moderadores: *Dr. Diego Barreiro*
Dr. Héctor Malagrino

16:00 – 16:30 **CONFERENCIA**
Priapismo: tips para el buen diagnóstico y tratamiento
Disertante: *Dr. Adrián Momesso*
Moderadores: *Dr. Héctor Malagrino*
Dr. Gerardo Perazzo

16:30 – 17:00 **CONFERENCIA**
¿Yo señor? ¡Si señor!
¡No señor!
¿Pues entonces quién tiene Conflicto de Interés?
Disertante: *Dr. Gerardo Perazzo*
Moderadores: *Dr. Miguel A. Costa*
Dr. Norberto Lafos

17:00 – 17:30 **CONFERENCIA**
Gradación del cáncer de próstata: ¿hay algo más que debamos saber?
Disertante: *Dra. Laura Jufe*
Moderadores: *Dr. Claudio Koren*
Dr. Héctor Malagrino

17:30 – 18:00 **CONFERENCIA**
Estado actual de la vigilancia activa en cáncer de próstata
Disertante: *Dr. Wenceslao Villamil*
Moderadores: *Dr. Miguel A. Costa*
Dr. Norberto Lafos

18:00 – 19:00 **SIMPOSIO**
LABORATORIO VARIFARMA
Cáncer de próstata. Prolaris, test diagnóstico
Disertante: *Dr. Juan Ramos Suppicich*
Moderadores: *Dr. Miguel A. Costa*
Dr. Norberto Lafos

PROGRAMA CIENTIFICO

VIERNES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020

19:00 – 19:30 **CONFERENCIA**
URS flexible: Vainas y acceso ureteral: verdades y mitos
Disertante: *Dr. Mariano González*
Moderadores: *Dr. Gabriel Moncalvo*
Dr. Nicolás Rosenfeld

19:30 – 20:00 **CONFERENCIA**
Carcinoma de próstata oligometastásico. Rol del Urólogo
Disertante: *Dr. Gabriel Moncalvo*
Moderadores: *Dr. Claudio Koren*
Dr. Wenceslao Villamil

20:00 – 20:30 **CONFERENCIA**
Tratamiento endourológico de los tumores uroteliales altos
Disertante: *Dr. Pablo Contreras*
Moderadores: *Dr. Gabriel Moncalvo*
Dr. Nicolás Rosenfeld

20:30 – 21:00 **CONFERENCIA**
Rol del Urólogo frente a la RNMmp de próstata
Disertante: *Dr. Miguel Angel López*
Moderadores: *Dr. Claudio Koren*
Dr. Héctor Malagrino

A continuación programa del Sábado 12 de septiembre

SAU
SOCIEDAD ARGENTINA DE UROLOGIA
Fundada en 1923

tSociedad Argentina de Urología - SAU
Teléfono: 011-4963-4336
Email: sau@sau-net.org
Web: www.sau-net.org

Momentum®

5 mg
20 mg

Comprimidos

Tadalafilo

Plena actividad sexual siempre

- **Momentum**® es la última generación en inhibidores FDE-5.
- **Momentum**® mejora la función sexual y los síntomas del tracto urinario inferior potenciando sus efectos en combinación con Espontal®.
- **Momentum**® tiene un comprobado efecto terapéutico.
- **Momentum**® es seguro en tratamiento prolongado.
- Los alimentos no alteran la correcta absorción de **Momentum**®.

Presentación:
20 mg x 2, 4 y 8 comprimidos.
5 mg x 30 comprimidos y **NUEVA PRESENTACIÓN** x 60 comprimidos.

LABORATORIOS PANALAB

Famatina 3415 - (C1437IOK) Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Tel.: 4117-7700 y rotativas - 0800-222-2666
e-mail: informacion@panalab.com.ar - Web: www.panalab.com.ar

MPV00931-5

Prostoklar

TAMSULOSINA 0,4 mg

Liberación Controlada en la terapia de la HPB

LIBERACIÓN CONTROLADA

- ✓ **Sistema de liberación controlada** que proporciona un efecto gradual ideal
- ✓ **Reduce los valores de la IPSS en los pacientes con HPB**
- ✓ **Mejora los LUTS y la disfunción sexual en los pacientes con HPB**
- ✓ **Resuelve la sintomatología de disfunción sexual**
- ✓ **Mejora significativamente la calidad de vida, especialmente la molestia producida por los síntomas urinarios**
- ✓ **Cómoda posología**
- ✓ **Óptima tolerabilidad**

PRESENTACIONES X 30 y 60

FÓRMULA: *Cada comprimido de liberación prolongada contiene:*
Tamsulosina clorhidrato (equivalente a 367 µg de Tamsulosina) 0,40 mg.

PRESENTACIÓN: Envases con 30 y 60 comprimidos de liberación prolongada.

POSOLOGÍA Y MODO DE ADMINISTRACIÓN:
Dosis habitual: 1 comprimido por día, aproximadamente media hora después de la misma comida todos los días.
El comprimido debe ingerirse entero, con 150 ml de líquido, sin romperlo ni masticarlo.

PAMI INSSJP · IOMA · pap Programa de ayuda al paciente · MPN MEDICAMENTOS DE PRIMER NIVEL

Información completa para prescribir
Código Respuesta Rápida (Quick Response Code, QR)

Material para uso exclusivo del Profesional facultado para prescribir o dispensar medicamentos. Prohibida su entrega a pacientes, consumidores y/o el público en general.

Baliarda
Vida con salud
www.baliarda.com.ar

Si el PSA de su paciente con ADT incrementa rápidamente, RETRASE LA PROGRESIÓN

PARA PACIENTES CON CPRC NO METASTÁSICO

- ✓ En tratamiento con ADT.
- ✓ Con un rápido aumento en el PSA y un tiempo de duplicación del mismo menor a 10 meses.
- ✓ Sin metástasis detectables por métodos radiológicos convencionales.

Erleada®
(apalutamida) comprimidos recubiertos

DOSIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Erleada® (apalutamida) ofrece una dosis única oral diaria[1]

La dosis recomendada de Erleada® es de 240 mg (4 comprimidos recubiertos de 60mg) administrados **POR VÍA ORAL UNA VEZ AL DÍA[1]**

Los pacientes deben recibir análogo GnRH durante el tratamiento con Erleada® o deben haber tenido una orquectomía bilateral.[1]

- No hay requisitos adicionales de monitoreo de laboratorio además de las evaluaciones de rutina para identificar eventos adversos.[1]
- Puede tomarse con o sin alimentos. Los comprimidos se deben tragar enteros.[1]
- No se requiere ajuste inicial en la dosis de Erleada® para insuficiencia renal o hepática.[1]

MODIFICACIONES DE LA DOSIS: En caso de que el paciente presente una toxicidad de grado 3 o un evento adverso insoportable, mantenga la dosis hasta que los síntomas mejoren y vuelvan al grado 1 u original, entonces continúe con la misma dosis o una dosis reducida (180mg o 120 mg).[1]

ERLEADA® NOMBRE GENÉRICO: APALUTAMIDA. **CONDICIÓN DE VENTA:** venta bajo receta archivada (Argentina). **COMPOSICIÓN:** cada comprimido recubierto contiene Apalutamida 60mg, excipientes C.S. **ACCIÓN TERAPÉUTICA:** Anti-andrógenos. **INDICACIONES:** ERLEADA® está indicado para el tratamiento de pacientes con cáncer de próstata no metastásico, resistente a la castración (CPRC-NM). **POSOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN:** La dosis recomendada de ERLEADA® es de 240 mg (cuatro comprimidos de 60 mg) administrada por vía oral una vez al día. Ingerir los comprimidos enteros. ERLEADA® se puede tomar con o sin comida. Los pacientes también deben recibir concomitantemente un análogo de la hormona liberadora de gonadotrofina (GnRH) o deben haber sido sometidos a una orquiectomía bilateral. **CONTRAINDICACIONES:** ERLEADA® puede causar daño fetal y potencial pérdida del embarazo. **ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:** Caídas y fracturas. Las caídas ocurrieron en 16% de los pacientes tratados con ERLEADA® y 12% de fracturas en el estudio SPARTAN. Convulsiones. Ocurrieron convulsiones en pacientes recibiendo ERLEADA®. Discontinuar permanentemente ERLEADA® en pacientes que desarrollen convulsiones durante el tratamiento. Interacciones Medicamentosas: Se espera que la coadministración de un inhibidor potente del CYP2C8 o CYP3A4 aumente la exposición en el estado estacionario de las fracciones activas. No se espera que los inhibidores leves o moderados del CYP2C8 o CYP3A4 afecten la exposición a la apalutamida. ERLEADA® es un inductor potente del CYP3A4 y CYP2C19, y un inductor débil del CYP2C9 en humanos. El uso concomitante de ERLEADA® con otros medicamentos que son metabolizados principalmente por el CYP3A4, CYP2C19 o CYP2C9 puede resultar en una exposición menor a estos medicamentos. Cuando sea posible, se recomienda la sustitución de estos medicamentos, o la evaluación por pérdida de actividad si el medicamento es continuado. La administración concomitante de ERLEADA® con medicamentos que son sustratos de la UDP-glucuronosil transferasa (UGT) puede resultar en una exposición disminuida. Se recomienda precaución si sustratos del UGT deben ser coadministrados con ERLEADA® y la evaluación por pérdida de actividad. **REACCIONES ADVERSAS:** Experiencia de los estudios clínicos: Las reacciones adversas más frecuentes (>10%) informadas en los estudios clínicos fueron: fatiga, hipertension, erupción, caídas, disminucion de peso, diarrea, nauseas, sofocos, disminución del apetito, edema periférico, fracturas. Reacciones adversas adicionales clínicamente significativas ocurrieron en el 2% o más de los pacientes tratados con ERLEADA® incluyeron hipotiroidismo, prurito, enfermedad isquémica cardíaca, y falla cardiaca. **PRESENTACIÓN:** ERLEADA® (apalutamida) 60 mg, comprimidos recubiertos, son comprimidos de forma oblonga, de color ligeramente amarillento a verde grisáceo, grabado con "AR 60" en una cara. Los comprimidos de ERLEADA® 60 mg están disponibles en frascos de 120 comprimidos. Cada frasco contiene desecante de sílica gel.

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL TITULAR DEL REGISTRO: ARGENTINA: JANSSEN CILAG Farmacéutica S.A., Mendoza 1259, (1428) Buenos Aires, Argentina. Fecha de última revisión: 02/10/2018. Para consultas escribir al mail: infojanssen@janar.jnj.com o comunicarse a las siguiente línea gratuita: Argentina: 0-800-122-0238. Este prospecto abreviado no contiene toda la información necesaria para la prescripción de este medicamento, siempre debe consultarse el prospecto completo del producto.

Referencias: 1. Información para prescribir de Erleada® / **PSA:** Antígeno específico de la próstata / **ADT:** Terapia de deprivación androgénica / **GnRH:** Hormona liberadora de gondorfina

© Janssen Cilag Farmacéutica S.A. 03, 2019 // CP-79237

Para consultas, solicitudes, pedidos de búsquedas bibliográficas, reportes de eventos adversos y/o reclamos de calidad por favor comunicarse a:

INFO Janssen
Información Científica
www.janssen.com

Janssen Argentina
0800-122-0238
infojanssen@janar.jnj.com

janssen Oncology
PHARMACEUTICAL COMPANIES OF Johnson&Johnson

PROGRAMA CIENTIFICO

SÁBADO 12 DE SEPTIEMBRE DE 2020

08:30 – 09:00 **CONFERENCIA**
Cáncer de próstata. ¿Qué hacemos ante la progresión a nuevas hormonas?
Disertante: *Dr. Diego Barreiro*
Moderadores: *Dr. Héctor Malagrino*
Dr. Gerardo Perazzo

09:00 – 09:30 **CONFERENCIA**
Enucleación endoscópica prostática con láser: ¿En cualquier volumen prostático?
Disertante: *Dr. Mariano González*
Moderadores: *Dr. Leandro Capiel*
Dr. Wenceslao Villamil

09:30 – 10:00 **CONFERENCIA**
Estrechez uretral de etiología iatrogénica: ¿Cómo prevenirla?
Disertante: *Dr. Leandro Capiel*
Moderadores: *Dr. Javier Belinky*
Dr. Gabriel Moncalvo

10:00 – 10:30 **CONFERENCIA**
Gestos mínimos que optimizan el implante protésico
Disertante: *Dr. Adolfo Casabé*
Moderadores: *Dr. Javier Belinky*
Dr. Adrián Momesso

10:30 – 11:00 **CONFERENCIA**
Es tiempo de hablar de pacientes libres de cálculos
Disertante: *Dr. Norberto Bernardo*
Moderadores: *Dr. Javier Belinky*
Dr. Adrián Momesso

11:00 – 11:30 **CONFERENCIA**
Cirugía y decisiones estratégicas en el tratamiento del carcinoma renal avanzado
Disertante: *Dr. José Rozanec*
Moderadores: *Dr. Claudio Koren*
Dr. Wenceslao Villamil

11:30 – 12:00 **CONFERENCIA**
Actualización en el manejo de los traumatismos renales y génito-urinarios
Disertante: *Dr. Claudio Koren*
Moderadores: *Dr. Gabriel Moncalvo*
Dr. Carlos Palazzo

12:00 – 12:30 **CONFERENCIA**
Reconstrucción peniana. Múltiples etiologías, múltiples opciones quirúrgicas
Disertante: *Dr. Javier Belinky*
Moderadores: *Dr. Leandro Capiel*
Dr. Juan Ramos Suppicich

12:30 – 13:00 **CONFERENCIA**
Cáncer de pene: Epidemiología y prevención?
Disertante: *Dr. Carlos Palazzo*
Moderadores: *Dr. Héctor Malagrino*
Dr. Juan Ramos Suppicich

13:00 **CLAUSURA DEL SIMPOSIO**

LA SOCIEDAD ARGENTINA DE UROLOGÍA NO SE RESPONSABILIZA POR LAS OPINIONES EMITIDAS EN LAS PRESENTACIONES, NI SE IDENTIFICA NECESARIAMENTE CON LOS JUICIOS O APRECIACIONES DE LOS DISERTANTES.

LECTRUM

Preservando la vida de los pacientes con cáncer de próstata[1]

EFICACIA CLÍNICA DEMOSTRADA en el Tratamiento del **Cáncer de Próstata**[2,3]

SANDOZ A Novartis Division

Novartis Argentina S.A.
Sandoz
Ramallo 1851, Planta Baja
CP 1429
Argentina
Tel: +54 11 4703 - 7000

Escanee el código para acceder a la información del producto.

Referencias: 1. Labrie F. Medical castration with LHRH agonists: 25 years later with major benefits achieved on survival in prostate cancer. J Androl 2004;25(3):305-13. 2. Br.J Urol.1987 Mar;59(3):248-54 3. J Urol. 1990 Jan;143(1):68-71

Material exclusivo del profesional médico y/o farmacéutico. prohibida su exhibición, entrega a pacientes, consumidores y/o al público en general.

AR1903986489 - Fecha:04/2019

Un enfoque diferente para la Vejiga Hiperactiva

Myrbetric®

mirabegron 25 / 50 mg

El primer agonista ß3 adrenérgico aprobado por EMA y FDA(*)

- Aumenta la capacidad de almacenamiento de la vejiga[1]
- Eficacia demostrada sobre los síntomas de la vejiga hiperactiva[1]
  - Reduce la incontinencia y la frecuencia de micción
  - Aumenta el volumen de orina eliminada por micción
- Mejora significativamente la calidad de vida[1, 2]
- **Buen perfil de seguridad y tolerabilidad[2]**
- **Incidencia de "boca seca" similar a placebo[3]**
- Cómoda posología: 50 mg, una vez al día

PRESENTACIONES

25 / 50 mg

Por 30 comprimidos de liberación prolongada

Para más información sobre MYRBETRIC® visite www.gador.com.ar

PAP Preserfar

RECETARIO SOLIDARIO

MPN

Referencias: 1. Prospecto Myrbetric. Gador S.A. Fecha de última revisión junio 2017. 2. Chapple CR et al. Mirabegron in overactive bladder: a review of efficacy, safety and tolerability - Neurourol Urodyn 2014; 33 (1): 17-30. 3. Khullar V et al. Efficacy and tolerability of mirabegron a ß(3) - adrenoreceptor agonist, in patients with overactive bladder: results from a randomised European-Australian phase 3 trial. Eur Urol. 2013; 63 (2): 283-95.

(*) Al mes de Febrero 2020

Siguiendo pautas internacionales, Myrbetric® se encuentra adherido al Plan de Gestión de Riesgos (PGR) aprobado por la ANMAT.
PGR: es un programa estratégico de seguridad para minimizar los riesgos potenciales conocidos de un producto, preservando sus beneficios terapéuticos.

Ante cualquier consulta contactar al Departamento de Farmacovigilancia Gador: farmacovigilancia@gador.com.ar/0800-220-2273 (CARE)

astellas
Leading Light for Life

Gador

ARANCELES DE INSCRIPCIÓN

CATEGORIAS	VALOR
Miembros Asociados SAU	$ 3.000
No socios	$ 6.000

INFORMES E INSCRIPCIÓN

SAU
SOCIEDAD ARGENTINA DE UROLOGIA
Fundada en 1923

Sociedad Argentina de Urología - SAU
Teléfono: 011-4963-4336
Email: sau@sau-net.org
Web: www.sau-net.org

Vesomni®

Solifenacina 6 mg / Tamsulosina 0,4 mg

La fuerza de la combinación

LA COMBINACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE PACIENTES CON STUI/HPB

- Reduce los síntomas de urgencia y frecuencia medidos por TUFS[1]
- Mejora significativamente el IPSS comparado con placebo[1]
- Buena tolerabilidad y baja tasa de abandono[1, 2]
- Incidencia de RUA similar a placebo[1]
- Mejora el sueño y la calidad de vida[1]
- Cómoda posología: 1 comprimido por día[3]
- Presentación: por 30 comprimidos de liberación prolongada

PAMI INSSJP | PAP Preserfar | Recetario Solidario

Siguiendo pautas internacionales, VESOMNI® se encuentran adherido al Plan de Gestión de Riesgos (PGR) aprobado por la ANMAT. PGR: es un programa estratégico de seguridad para minimizar los riesgos potenciales conocidos de un producto, preservando sus beneficios terapéuticos. Ante cualquier consulta contactar al Departamento de Farmacovigilancia Gador a farmacovigilancia@gador.com ó al (011) 48589000 - interno 229 - 0800-220-2273 (CARE)

Para más información sobre VESOMNI® visite www.gador.com.ar

Referencias: 1. Van Kerrebroeck P, et al; Combination therapy with solifenacin and tamsulosin oral contolled absorption system in a single tablet for lower urinar tract symptoms in men: efficacy and safety result from the randomized controlled NEPTUNE trial. Eur Urol. 2013 Dec;64(6):1003-12. **2.** Drake MJ et al; NEPTUNE Study Group. Long-term safety and efficacy of single-tablet combinations of solifenacin and tamsulosin oral controlled absorption system in men with storage and voiding lower urinary tract symptoms: results from the NEPTUNE Study and NEPTUNE II open-label extension. Eur Urol; 2015 Feb;67(2):262-70. **3.** Prospecto Vesomni Gador S.A. Fecha de última revision ANMAT Jun-2019. STUI: Síntomas de Tracto Urinario Inferior / HPB: Hiperplasia Prostática Benigna / TUFS: ScorebTotal de Urgencia y Frecuencia / IPSS: Score Internacional de Síntomas Prostáticos / RUA: Retención Urinaria Aguda.

astellas
Leading Light for Life

Gador